

نحوه نگهداری اپرکس

داروهای مصرفی بیماران دیالیزی

1. داروهای حاوی کلسیم: که می توانند باعث تهوع و استفراغ شوند.
2. داروهای حاوی آلومینیم: چون در مغز استخوان رسوب می کنند، از مصرف دراز مدت آن باید خودداری شود.
3. ترکیبات کلسیم بهتر است همراه با ویتامین دی مصرف شوند تا جذب کلسیم افزایش یابد.
4. مکمل های ویتامین دی همراه با آب زیاد مصرف شود تا از بروز بیوست جلوگیری شود.
5. مکمل های کارنیتین از گرفتگی عضلات و کاهش فشار خون در حین دیالیز جلوگیری می کند.
6. اپرکس در درمان آنمی در نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز می باشد. که به دو صورت وریدی و زیر جلدی مصرف می شوند.
7. می شوند.

*نحوه نگهداری اپرکس:

- اپرکس باید در دمای 4-8 درجه سانتی گراد در داخل یخچال نگهداری شود
- دارو باید از یخ زدگی و از نور مستقیم محافظت شود. در زمان حمل و نقل در کنار یخ گذاشته شود
- به هیچ وجه دارو را تکان ندهید
- محلول تزریقی باید قبل از مصرف از نظر ذرات یا تغییر رنگ بررسی شود
- تاریخ انقضای دارو کنترل شود
- اپرکس را نباید رقیق کرد و به ظرف دیگر منتقل کرد و یا با محلول های دارویی دیگر مخلوط نمود

سحر شاه وردی

واحد آموزش و پیگیری بیمار

ارتباط با ما و پاسخگویی به سوالات: 03834259101-18

واحد آموزش و پیگیری بیمار: طبقه دوم - داخلی 221

