


مراقبت از شالدون

کاتتر وریدی مرکزی – شالدون:

کاتتر به زبان ساده لوله باریک و دو شاخه ای است که بسته به شرایط بیمار در گردن، سینه و یا کشاله ران تعبیه می شود



مراقبت از شالدون:

1. در طول قطع و وصل دیالیز، پرستار و بیمار حتما باید از ماسک استفاده نمایند
2. سر کاتتر و لوله ها هرگز نباید در معرض هوای آزاد باشد
3. سرپوش های کاتتر همیشه باید بسته باشد
4. پانسمان استریل روی کاتتر همیشه قرار داشته باشد
5. از وارد آمدن ضربه و یا ایجاد کشش به کاتتر، بخصوص هنگام دیالیز بپرهیزید
6. از کاتتر جهت گرفتن نمونه خون و تزریق دارو و زدن سرم به هیچ عنوان استفاده نکنید
7. در صورت جابجا شدن کاتتر، آن را به جلو یا عقب حرکت ندهید
8. کلمپ های کاتتر غیر از زمان دیالیز باز و بسته نشود (فقط توسط پرستار)
9. از هرگونه خم شدن لوله های کاتتر در زمان غیر دیالیز جلوگیری کنید
10. قسمت خارجی کاتتر هرگز نباید در آب حمام غوطه ور شود

11. در صورتی که کاتتر از محل خود خارج گردید، به هیچ عنوان دستکاری یا سعی در برگرداندن آن به محل اولیه خود نکنید ، فقط بلافاصله به پزشک معالج مراجعه نمایید
12. در صورت استحمام، بلافاصله محل کاتتر باید به صورت استریل خشک و پانسمان شود
13. زمان استحمام باید تا حد امکان کوتاه باشد
14. برای استحمام نباید از دوش آب استفاده شود. بهتر است به صورت ترتیبی هر ناحیه را شستشو دهید تا آب کمتری به سمت کاتترسرازیر شود
15. به هیچ عنوان سر ورودی کاتتر ها دستکاری و باز نشود
16. محل کاتتر کاملا تمیز و خشک نگهداری شود
17. در صورت خونریزی از محل کاتتر، فوراً به پزشک معالج اطلاع رسانی شود
18. در صورت تب و لرز و قرمزی پوست اطراف کاتتر، سریعاً به پزشک مراجعه نمایید
19. اگر دیالیز شما به هر علتی قطع شد، ولی کاتتر را به صلاحدید پزشک خود نگاه داشته اید، حتماً در یک مرکز بهداشتی-درمانی چند بار در هفته لوله های کاتتر را هیپارینه کنید تا از لخته شدن کاتتر و انسداد لاین ها جلوگیری شود
20. پانسمان کاتتر را حداقل 3 بار در هفته در بخش دیالیز یا یک مرکز درمانی مجهز به روش استریل تعویض نمایید

سحر شاه وردی

واحد آموزش و پیگیری بیمار

ارتباط با ما و پاسخگویی به سوالات: 03834259101-18

واحد آموزش و پیگیری بیمار: طبقه دوم - داخلی 221